


NANOBIOCIDE
NF

نانو بیوساید



گروه دارویی: ضد عفونی کننده

شکل دارویی: مایع، فاقد بو

ترکیبات موثر: نانو ذرات نقره 4000 ppm

طیف اثر: انواع ویروس های پوشش دار، بدون پوشش، باکتری های گرم مثبت و منفی، قارچ ها، اسپورها، اوسیست ها و تک یاخته ای ها، نانو سیلور در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان جهت ضد عفونی نقاط حساس و پر خطر توصیه می شود.

گونه هدف: طیور

ویژگی های منحصر به فرد:

- ماندگاری طولانی مدت (عدم تجزیه و تبخیر نانو ذرات نقره)
- قابل استفاده به صورت مه پاشی
- عدم مشاهده مقاومت میکروبی
- فاقد هر گونه سمیت استنشاقی، سلولی، خوراکی و حساسیت جلدی برای مصرف کننده و محیط زیست
- فاقد خوردگی برای سطوح و ابزار
- اثر گذاری در pH های اسیدی و بازی
- اثر گذاری در طیف وسیعی از دما

موارد مصرف:

- مه پاشی جهت پیشگیری از شیوع عفونت های تنفسی
- ضد عفونی قفس های طیور و دستگاه های جوجه کشی
- حذف بیوفیلم از سیستم توزیع آب
- ضد عفونی سطوح شامل محوطه فارم، سقف، دیوار، بستر، پنجره ها، دانخوری و آبخوری
- ضد عفونی حوضچه ورودی به سالن های پرورش
- ضد عفونی کامیون های حمل جوجه و مرغ
- ضد عفونی سالن های کشتار و بسته بندی
- ضد عفونی فیلتر دستگاه های هواساز

مزایای نانو بیوساید در مرغداری:

- پیشگیری و کنترل عوامل بیماری زای ویروسی از قبیل آنفلوانزا، برونشیت عفونی و نیوکاسل در فارم
- کاهش محسوس بوهای نامطبوع ناشی از فضولات و گازهای آلاینده مانند آمونیاک، سولفید هیدروژن و...
- بهبود ضریب تبدیل
- تهویه هوای داخل سالن و ایجاد شادابی در گله
- صرفه جویی قابل توجه در هزینه های تولید، درمان و افزایش سوددهی

روش مصرف:

محل استفاده	غلظت (لیتر نانو بیوساید در لیتر آب)	نحوه استفاده
تمامی سطوح و قفس ها پس از پاکسازی	۱/۴۰۰ - ۱/۲۰۰	یک لیتر محلول آماده مصرف در ۵۰ متر مربع از سطح استفاده شود و مدت زمان لازم برای اثر گذاری کامل ۲۰-۱۰ دقیقه است
دانخوری، آبخوری، پوشال و بستر	۱/۴۰۰ - ۱/۲۰۰	یک لیتر محلول آماده مصرف در ۵۰ متر مربع از سطح استفاده شود و مدت زمان لازم برای اثر گذاری کامل ۲۰-۱۰ دقیقه است
مه پاشی	۱/۵۰۰	یک لیتر محلول آماده مصرف در ۵۰ متر مکعب از سطح استفاده شود
پیشگیری از تشکیل بیوفیلم	۱/۸۰۰۰	جهت حذف بیوفیلم از سیستم آبخوری در ابتدای هر دوره از محلول ۰/۵ درصد نانو بیوساید به مدت ۴-۶ ساعت استفاده نموده و سپس تمام لوله ها به طور کامل با آب گرم و بر فشار شسته شود

موارد احتیاط:

۲۴ ساعت قبل و بعد از واکسیناسیون مصرف نانو بیوساید قطع گردد.
رقیق سازی محلول نانو بیوساید در صورت امکان در آب بدون کلر صورت گیرد.

تولید و بسته بندی:

در ظروف پلی اتیلنی ۱ و ۴ لیتری و اسپری آماده مصرف ۵۰۰ میلی لیتری عرضه شده و از زمان تولید تا دو سال اعتبار مصرف دارد.